



مراقبت‌های لازم بعد از عمل

پیوند قرینه

تیمه کنندگان : گروه آموزشی به بیمار

مرکز آموزشی پزشکی و درمانی امام حسین (ع)

شماره سند: ۲۲-۲۹-۹۴


شماره پارتی: ۰۲

این مسئله به خصوص، بسیار در کودکان اتفاق می‌افتد. بخته‌شل و یا پاره شده باید سریعاً توسط پزشک معالج برداشته شود در غیر اینصورت باعث تحریک چشم و دفع پیوند می‌شود.

۸۰٪ موارد دفع پیوند طی ۶-۱۲ ماه اتفاق می‌افتد و پس از آن این احتمال رو به کاهش می‌گذازد و پس از دو سال شانس آن خیلی کم می‌شود ولی تا آخر عمر وجود دارد.




قرینه‌شکل ماه پس از جراحی



تا زمانی که بخته‌های عمل کشیده نشده اند ممکن است بخته‌ها خودبخود شل و یا پاره شوند که مهمترین علامت آن احساس وجود جسم خارجی در چشم است که همراه با آن قرمزی چشم و اشک ریزش هم اتفاق می‌افتد. گاهی به علت کمبود حس قرینه، شل و یا پاره شده اما ممکن است بیمار متوجه آن نشود در این حالت قرمزی چشم وجود دارد.

مراقبت های بعد از عمل پیوند قرنیه



کسی که عمل پیوند انجام می دهد تا سه هفته اول خطر دفع قرنیه برایش وجود ندارد ولی احتمال ایجاد عفونت چشمی شدید بسیار بالا است . خطر دفع پیوند بعد از سه هفته شروع شود . این پدیده ابتدا به صورت خفیف شروع شده و در صورتی که درمان شود ممکن است به دفع کامل منجر شود لذا دانستن علائم شروع دفع بسیار مهم است و هر بیمار باید دقیقا آثر بداند.

این علائم عبارتند از :

(الف) حساسیت به نور (بیمار نمی تواند به خوبی چشم خود را در نور باز

کند)

(ب) کاهش و تاری دید با شدت متفاوت (بیمار احساس می کند از پشت یک

شیشه مه گرفته به بیرون نگاه می کند)

بنا بر این بیمارانی که تحت عمل پیوند قرار می گیرند باید به طور منظم

قدرت بینایی خود را در منزل اندازه گیری کنند (با نگاه کردن به تابلو

، ساعت دیواری یا سایر اشیاء) و به محض کاهش دید و یا بروز علائم فوق به

پزشک معالج ، و در صورت عدم دسترسی ، به اورژانس های چشم پزشکی

مراجعه نمایند زیرا هر چه در مان دیرتر شروع شود موفقیت کمتری خواهد

داشت و گاهی اگر خیلی دیر شده باشد ممکن است دفع کامل ایجاد شود.

* سه هفته اول پس از عمل پیوند از لحاظ ترسیم زخم محل و ایجاد عفونت در چشم بسیار مهم است و لازم است طی این مدت چندین بار تحت نظر پزشک معالج مورد معاینه قرار گیرید.

* مصرف درست و به موقع قطره های چشمی و سایر دارو های تجویز شده

در موفقیت عمل اهمیت زیادی دارد لذا ضمن سوال کردن از پزشک خود در

این رابطه ، جهت اطمینان بیشتر از نحوه استفاده آنها در هر مراجعه دارو

ها را مجدداً به پزشک نشان دهید.

* زمان استحمام و سجده کردن پس از عمل را ، از پزشک خود سوال کنید .

اما به طور کلی اگر عمل جراحی بدون عارضه باشد ، حمام کردن بعد از 5 روز

و سجده کردن بعد از 10 روز بلا مانع است ولی مراقبت باشید که جبین

شستن سر هیچ گونه فشاری به چشم وارد نشود.

* قرنیه پیوند شده بعد از عمل حداقل 6-9 ماه فاقد حس می باشد بنابراین

ممکن است تماس اجسام خارجی با آن احساس نشود ، به همین جهت بیمار

باید خیلی مراقب باشد .

جهت تمیز کردن اطراف چشم از دستمال کاغذی و یا پارچه زیر استفاده

نکنید . هنگام چکاندن قطره داخل چشمی ، نوک قطره چکان را به چشم

نزدیک نکنید زیرا ممکن است تماس اجسام خارجی را حس نکرده و

در نتیجه دچار خراش و یا زخم قرنیه شوید.

* قرنیه پیوند شده هیچگاه مقاومت اولیه خود را بدست نمی آورد و لذا به

شدت مواظب باشید که ضربه و یا فشار خارجی به چشم وارد نشود . رعایت

این مسئله اگر چه در چند ماه اول بعد از عمل خیلی ضروری است ولی تا

آخر عمر باید ادامه یابد .