

کلونیدو گرو ل (اسویکس)



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی

بیمارستان امام حسین (ع)

تهیه کننده: واحد آموزش به بیمار

شماره سند: SL-PA-69

شماره بازنگری: ۰۱

مرداد ۱۴۰۱

در شدید معده یا شکم

استفراغ شبیه همراه به خون یا شیشه کف قهوه

مفوع خونی یا سیاه

ادرار خونی، قرمز، صورتی یا تیره

علامه مشکلات کلیوی مانند تغییر در مقدار ادرار

تداخلات دارویی کلونیدو گرو ل:

تداخلات دارویی ممکن است عملکرد و تاثیر دارو ها را تغییر

دهند یا باعث افزایش ریسک بروز عوارض جانبی آنها شود.

بنابر این برای مصرف این دارو، لیست تمام دارو هایی که

مصرف می کنید را با پزشکتان در میان بگذارید.

چنانچه در طول درمان با داروی کلونیدو گرو ل، باید دارویی را

مصرف کنید، پزشکتان را در جریان مصرف این دارو قرار داده

با با داروساز مشورت نمایید.

هیچ دارویی را بدون تأیید پزشک شروع قطع یا تغییر ندهید.

توجهات لازم در هنگام مصرف دارو:

افرادی که ناراحتی گوارشی دارند، طبق نظر پزشک می

توانند در زمان مصرف کلونیدو گرو ل از پنتوپرازول استفاده

کنند.

مصرف غذا، تاثیر روی جذب ندارد.

شرایط نگهداری دارو در ظروف در بسته و در دمای ۲- تا ۱۵+

درجه و دور از نور می باشد.



تهران خیابان شهید مدنی تلفن: ۷۳۳۳۳۰

www.ehmc.ir

در صورت تداوم یا بدتر شدن، هر یک از عوارض زیر، در اسرع وقت با

پزشک مشورت نمایید:

خونریزی یا کبودی آسان

ناراحتی یا درد معده

اسهال

یبوست

داروی کلونیدو گرو ل در موارد نادر ممکن است باعث خونریزی در

معده، روده، چشم یا مغز و یا باعث اختلال خونی بسیار جدی شود.

و علامه آنها ممکن است هر زمانی پس از شروع این دارو ظاهر شود.

در صورت بروز هر یک از این علامه فوراً به پزشک مراجعه کنید.

تشخیص

سر درد شدید ناگهانی

گیجی

تب، ضعف یا خستگی غیر معمول

تغییرات بینایی


خونریزی کنترل نشده از لثه یا بینی

رنگ پریدگی شدید پوست

زردی چشم یا پوست

لکه های بنفش پوستی





۳- اگر یک نوبت استفاده از دارو را فراموش کردید:

در صورتی که کمتر از ۱۲ ساعت از زمان مصرف دارو گذشته است، به محض یادآوری دارو را استفاده کرده و در ساعت مقرر نیز دوز بعدی دارو را مصرف کنید.

در صورتی که بیشتر از ۱۲ ساعت از زمان مصرف دارو گذشته است، در ساعت مقرر دوز بعدی دارو را استفاده کنید و نیازی به مصرف دوز برایی دارو نیست.

۴- این دارو را می توانید همراه با غذا یا بدون آن مصرف نمایید.

۵- همه دارو ها ممکن است عوارض جانبی ایجاد کنند، اما بسیاری از مصرف کنندگان نیز هیچ نوع عارضه ای بروز نمی دهند. یکسری از عوارض نیز بعد از گذشت مدت کوتاهی از مصرف دارو از بین می روند.

عوارض احتمالی شامل:

تب، علائم عفونت و خستگی شدید
زردی پوست و چشم
خونریزی های نقطه ای زیر پوستی
کاهش سطح هوشیاری (به علت آسیب کبدی)

این دارو معمولاً در کنار آسپرین استفاده میشود. شیوه مصرف این دارو معمولاً روزی یک عدد است. در صورتی که پزشک برای شما این دارو ها را تجویز کرده است باید به موارد زیر توجه کنید:

۱- میزان و مدت مصرف دارو:

معمولاً میزان مصرف این دارو ها روزانه اعدد قرص ۷۵ میلی گرمی است. مدت استفاده بر اساس علت شروع دارو متفاوت است و ممکن است گاهی لازم باشد تا آخر عمر استفاده شود. به خاطر داشته باشید دارو ها را خود سرانه قطع نکنید و

حتماً طبق دستور پزشک عمل کنید.

۲- قبل از شروع مصرف، یا حین مصرف دارو اگر هر یک از شرایط زیر را دارید به پزشک خود اطلاع دهید:

حساسیت به پلاویکس یا کلوپیدوگرنل
خونریزی گوارشی شدید یا مغزی اخیر
مشکلات شدید کبدی

سابقه زخم معده یا مشکلات شدید گوارشی

جراحی اخیر حتی جراحی دندانپزشکی

مشکلات متوسط کبدی یا کلیوی

برنامه جراحی در یک هفته آینده (مهم)

ابتلا به سکنه مغزی در یک هفته اخیر

تصادف شدید و صدمات داخلی ناشی از آن

اطلاعات دارویی کلوپیدوگرنل:

کلوپیدوگرنل یک داروی ضد پلاکت است که با جلوگیری از چسبیدن پلاکت ها به یکدیگر عمل کرده واز تشکیل لخته های مضر جلوگیری می کند.

کلوپیدوگرنل دارویی است که در کشور ما با نام های تجاری پلاویکس، اسویکس و زیلت شناخته می شود. این دارو در قرص های ۷۵ میلی گرم موجود است خاصیت اصلی آن رقیق کنندگی خون است. مورد اصلی استفاده از این دارو در بیمارانی است که:

۱- استنت قلبی (فنر) برای آنها تعبیه شده و برای جلوگیری از تنگی مجدد در استنت نیاز به مصرف دارویی دارند تا از غلیظ شدن خون جلوگیری کند.

۲- برای جلوگیری از حملات قلبی و سکنه مغزی در افراد مبتلا به بیماری قلبی (حمله قلبی اخیر)، سکنه مغزی اخیر، یا

بیماری عروق محیطی استفاده میشود.

۳- هم چنین این دارو را متخصصین مغز و اعصاب نیز در

بیمارانی که مشکوک به سکنه های مغزی یا اینکه احتمال گرفتگی عروق مغزی مطرح باشد استفاده می کنند.

