

دستورالعمل تزریق ایمن در CT اسکن

- جهت تزریق CT آنژیو و داینامیک‌ها، رگ محیطی با آنژیوکت سبزرنگ از قسمت آرنج دست راست گرفته شود . اولویت با دست راست بیمار می‌باشد.
- جهت انجام تزریقات روتین مانند شکم و لگن و ریه و مغز با تزریق، رگ محیطی با آنژیوکت صورتی رنگ ترجیحا از قسمت آرنج دست راست گرفته شود و در غیر آن صورت از آرنج دست چپ استفاده شود.
- برای کودکان برحسب سن بیمار از آنژیوکت‌های آبی و... استفاده شود.

جهت تست آنژیوکت:

- با ۵CC نرمال سالین به صورت دستی آنژیوکت بیمار چک شود تا از سلامت آنژیوکت مطمئن شویم.
- برای بیمارانی که هوشیار نیستند پس از تزریق ۵CC نرمال سالین به صورت دستی محل تزریق از لحاظ تورم آن کنترل شود.
- تزریق از طریق CV Line و Port فقط در شرایط خیلی خاص و پس از هماهنگی با مسئول فنی و اتند آنکال امکان پذیر است و بایستی با حضور پزشک یا پرستار بخش انجام شود.
- تزریق از طریق آنژیوکت دورسال دست و یا پا فقط در موارد خاص و پس از هماهنگی بین اتند آنکال رادیولوژی با پزشک ارجاع دهنده بیمار صورت پذیرد.
- در مواردی که آنژیوکت مناسب وجود نداشت مشاوره جراحی عروق جهت تعبیه راه وریدی مناسب انجام گیرد.
- در زمان پذیرش از Save نبودن دست بیمار اطمینان حاصل شود، از اندامی که در یک هفته اخیر آنژیوگرافی عروقی انجام شده، رگ محیطی گرفته نشود.
- سابقه حساسیت دارویی بیمار در زمان پذیرش پرسیده شود.
- در صورت نشت دارو زیر جلد بلافاصله به بخش بستری بیمار اطلاع رسانی شده و محل نشت علامتگذاری شود، سپس پروتکل نشت دارو اجرا شود.
- به علائم درد بیمار در محل تزریق در حین انجام CT اسکن توجه شده و در صورت مشاهده هر گونه علائم، تزریق متوقف شود و آنژیوکت بیمار چک شود.