



عنوان سند:

شماره سند : RA-WI-

۱۱

شماره بازنگری : ۰۲

دستور العمل BE-D.C&BE

- شب قبل از رادیوگرافی ساعت ۷ شب شام، سوپ ساده میل شود. نیم ساعت بعد یک شیشه روغن کرچک (۴۰ گرم) را کاملاً بخورید تا صبح بجز مایعات دیگر نخورید. صبح روز آزمایش کاملاً ناشتا ساعت ۸:۳۰ تشریف بیاورید.
- عکس قبلی - آندوسکوپی - کولونوسکوپی - آزمایشات قبلی را همراه داشته باشید.
- چنانچه سابقه یبوست دارید از ۲ روز مانده به انجام گرافی از خوردن غذاهای سنگین و چرب پرهیز نمایید و بیشتر از غذاهای روان و سبک مثل سوپ ساده، انواع کمپوت استفاده کنید، همچنین ۲ روز متوالی ۶ عصر روغن کرچک را مصرف کنید.
- روز قبل از عکسبرداری بعد از هر وعده غذایی ۲ عدد قرص جویدنی دایمتیکون استفاده کنید.
- وسایل مورد نیاز:

BE.D.C: ۳ بسته سولفات باریم مارک بارکس

BE: ۴ بسته سولفات باریم مارک بارکس

BE.D.C: رکتال تیوب شماره ۲۶ یا ۲۸ ۲ عدد

BE: رکتال تیوب شماره ۲۶ یا ۲۸ ۱ عدد یا ۸ N: ENDO TRACHEAL TUBE

۱ عدد و برای بیماران مسن می توان از ۲۶: SOUND FOLLY استفاده نمود.

دستکش - زیر انداز - پنبه - سرنگ ۲۰ CC هر کدام ۱ عدد