



زخم

قرنیه

مرکز پزشکی آموزش درمانی امام حسین (ع)

➤ مراجعه مرتب و پیگیری درمان داشته باشید. در مورد

استخدام از پزشک خود سوال کنید. رعایت اصول بهداشت

فردی الزامی است.

➤ هنگام استفاده از قطره‌های چشمی مراقب باشید نوک

قطره با چشم تماس نداشته باشد. زخم قرنیه یک مشکل

جدی محسوب می‌شود معمولاً در عرض ۳-۲ هفته با درمان

خوب می‌شود.

➤ اگر بافت جوشگاهی که از التیام زخم قرنیه به جای

می‌ماند باعث بروز مشکل در بینایی شود ممکن است عمل

جراحی نیاز داشته باشد.



تهران - خیابان شهید مدنی تلفن: ۷۳۴۳۰

روابط عمومی: ۷۷۵۸۵۸۵۰

WWW.EHMC.IR

مراقبت از چشم:

➤ دستهای خود را مرتب بشوئید.

➤ از مالش چشم و دستکاری چشم مبتلا خودداری کنید.

➤ جهت تمیز کردن ترشحات چشم از پنبه و سرم نرمال

سالین می‌توان استفاده کرد.

➤ در اثر استفاده از قطره‌های ترکیبی ممکن است ترشحاتی

در چشم ایجاد شده و پلک‌ها و مژه‌ها را به هم بچسباند که

می‌توان با پنبه مرطوب به آهستگی تمیز کرد. از دستمال زبر


و خشک استفاده نکنید. تا بهبودی کامل از لنزهای تماسی

استفاده نکنید.

➤ از مصرف خودسرانه قطره‌های چشمی در صورت بروز

مشکل خودداری کنید. رژیم غذایی خاصی توصیه نمی‌شود.

داروهای تجویزی از سوی پزشک را دقیقاً مصرف کنید.



می‌تواند نفوذ کند و باعث ورود عفونت به داخل کره چشم شود در این صورت ممکن است بینایی به طور دائم از دست برود.

درمان:

- استفاده از قطره‌ها و پمادهای چشمی به طور مکرر، آنتی بیوتیک‌های وریدی، جهت تسکین درد می‌توان از استامینوفن استفاده کرد.

پیشگیری:

- دستان خود را مرتب بشوئید.
- از وارد آمدن آسیب به قرنیه جلوگیری کنید به هنگام تراشکاری و کار با فلز و چوب از عینک های مخصوص محافظت از چشم استفاده کنید.
- در استفاده از لنزهای تماسی کمال دقت را بکار بگیرید. لنزهای آرایشی را از داروخانه‌ها و مکان‌های معتبر تهیه کنید حتی الامکان از لنزهای آرایشی استفاده نکنید.

اشک ریزش، تاری دید، قرمزی در ناحیه سفیدی چشم، ترشح از چشم.

علل ایجاد زخم:

- استفاده از لنزهای تماسی به صورت طولانی یا لنزهای تماسی که درست در جای خود قرار نمی‌گیرد آسیب به قرنیه، پریدن یک جسم خارجی مثل تکه کوچکی از فلز، شن، شیشه به درون قرنیه، بسته نشدن کامل پلک‌ها



عوارض احتمالی:

- در صورت غفلت از زخم قرنیه، تخریب بافتی در قرنیه

زخم قرنیه بسیار است از خطر اشکبیه کی

دور لایه‌های بافت فلزات و ششکاف قرنیه یا

اړتیاخ ساتول‌های احتمالی

زخم قرنیه یکی از اورژانس‌های چشم محسوب می‌شود و با داشتن علائم زیر باید سریعاً به یک چشم پزشک مراجعه کرد.

علائم شایع:

- درد چشم که معمولاً شدید است حساسیت به نور زیاد، انقباضات ناگهانی و شدید در پلک چشم،

